## ROTAVIRUS VACCINE IN UNIVERSAL IMMUNIZATION PROGRAMME

- Rotavirus is a highly contagious virus. It is the most common organism that causes diarrhoea among children which may lead to hospitalization and death.
- There is no specific treatment for Rotavirus diarrhoea.
- Prevention of Rotavirus infection can be attained by improving personal and environmental hygiene and also by proper vaccination.
- Rotavirus vaccine will be administered 2.5 ml orally to infants at 6, 10 and 14 weeks along with other vaccines in routine immunization schedule in all government health facilities on every Thursday at free of cost.
- ✤ Rotavirus vaccine is being included in Universal Immunization Programme of Puducherry from 29<sup>th</sup> August, 2019 onwards.

## LAUNCHING OF ROTA VIRUS VACCINE

BY HONOURABLE CHIEF MINISTER OF PUDUCHERY Shri. V. NARAYANASAMY



## LAUNCHING OF ROTA VIRUS VACCINE BY HONOURABLE HEALTH MINISTER OF PUDUCHERRRY

BY HONOURABLE HEALTH MINISTER OF PUDUCHERRR Shri. MALLADI KRISHNA RAO





Government of Puducherry Department of Health and Family Welfare Services	
NATIONAL IMM	<b>IUNIZATION SCHEDULE</b>
At Birth	BCG, OPV, HEP- B
6 <sup>th</sup> Week (1 ½ Month)	Penta - 1, IPV - 1, OPV - 1, RVV - 1
10 <sup>th</sup> Week (2 ½ Month)	Penta - 2, OPV - 2, RVV - 2
14 <sup>th</sup> Week (3 ½ Month)	Penta - 3, IPV - 2, OPV - 3, RVV - 3
9 <sup>th</sup> Month	MR - 1, Vit - A
16 <sup>th</sup> -24 <sup>th</sup> Month	MR - 2, DPT (Booster), OPV (Booster), Vit-A
5 <sup>th</sup> Year	DPT 2 <sup>nd</sup> (Booster)
10 <sup>th</sup> Year	Td
16 <sup>th</sup> Year	Td
Pregnant Women	Td - 1 & 2 ( At the Interval of One Month )

## Along with love, care & affection Your Child Should be Fully Immunized



For further information, Please contact nearest Government Hospital, Subcentre & Primary Health Centre

<b>(</b>	பதுச்சேரி அரசு சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை	
தேசிய தடுப்பூசி அட்டவணை		
NATIONAL IMMUNIZATION SCHEDULE		
பிறந்தவுடன் At Birth	காசநோய் தடுப்பூசி, மஞ்சள் காமாலை–B, போலியோ சொட்டு மருந்து BCG, HEP- B, OPV	
6 வது வாரம் (1½ மாதம்) 6 <sup>th</sup> Week (1 ½ Month)	பென்டா தடுப்பூசி–1, போலியோ (தடுப்பூசி–1 + சொட்டு மருந்து–1) ரோட்டா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து–1 Penta - 1, IPV - 1, OPV - 1, RVV - 1	
10 வது வாரம் (2 ½ மாதம்) 10 <sup>th</sup> Week (2 ½ Month)	பென்டா தடுப்பூசி–2, போலியோ சொட்டு மருந்து–2, ரோட்டா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து–2 Penta - 2, OPV - 2, RVV - 2	
14 வது வாரம் (3 ½ மாதம்) 14 <sup>th</sup> Week (3 ½ Month)	பென்டா தடுப்பூசி - 3, போலியோ (தடுப்பூசி-2, + சொட்டு மருந்து-3), ரோட்டா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து- 3 Penta - 3, IPV - 2, OPV - 3, RVV - 3	
9 வது மாதம் 9 <sup>m</sup> Month	தட்டம்மை + ரூபெல்லா தடுப்பூசி–1, வைட்டமின் A MR - 1, Vit - A	
16 - 24 வது மாதம் 16 <sup>m</sup> - 24 <sup>m</sup> Month	தட்டம்மை + ரூபெல்லா தடுப்பூசி–2, முத்தடுப்பூசி, போலியோ, வைட்டமின் A MR - 2, DPT (Booster), OPV (Booster), Vit-A	
5 வயது 5 <sup>n</sup> Year	முத்தடுப்பூசி–2 DPT 2 <sup>er</sup> Booster	
10 ഖധத്ച 10" Year	இரணஜன்னி + தொண்டை அடைப்பான் தடுப்பூசி Td	
16 வயது 16 <sup>th</sup> Year	இரணஜன்னி + தொண்டை அடைப்பான் தடுப்பூசி Td	
காப்பிணிகளுக்கு Pregnant Women	இரண்ஜன்னி + தொண்டை அடைப்பான் தடுப்பூசி – இரண்டு முறை (ஒரு மாத இடைவெளியில்) Td - 1 & 2 ( At the Interval of One Month )	
உங்கள் அன்பான மழலைச்செல்வங்களுக்கு அனைத்து தடுப்பு மருந்துகளும் உரிய காலத்தில் கிடைத்திட அணுகளிர். அரசு மருத்துவமனை, துணை மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை		